




# Adrecaine®

Número de registro: Q-0449-093  
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO  
Su venta requiere receta médica cuantificada



Solución inyectable  
Procaína y epinefrina  
Anestésico local y vasoconstrictor

## FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:

Procaína HCl.....	25 mg
Epinefrina.....	0.0333mg
Vehículo c.b.p.....	1 mL

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea y epidural

## PRESENTACIÓN

50 mL.

## INDICACIONES

Anestésico local para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos, útil en intervenciones quirúrgicas menores y tratamiento de heridas externas, anestesia epidural y bloqueos neurales. La epinefrina como vasoconstrictor ayuda en el control de hemorragias.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**Por infiltración:** 2-10 mL.

**Para anestesia epidural,** acorde al peso corporal:

**Bovinos (productores de carne y leche) y equinos:** 10-30 mL.

**Porcinos, ovinos y caprinos:** 5-15 mL.

**Caninos:** 0.5-5 mL.

A recomendación del Médico Veterinario.

## TIEMPO DE RETIRO

No requiere periodo de retiro para carne y leche. No administrar a equinos destinados al consumo humano.

## ADVERTENCIAS

Se sugiere solo como anestésico local o regional. La aplicación accidental por vía intravenosa puede causar reacciones adversas graves. Los equinos pueden ser excesivamente susceptibles a reacciones adversas. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 25 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.