



# Sulfratryl

Número de registro: Q-0449-118  
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO  
Su venta requiere receta médica



Polvo oral  
Sulfatiazol y sulfametacina  
Antibiótico y antiprotozoario bacteriostático de amplio espectro

## FÓRMULA

Cada 1 g contiene:  
Sulfatiazol sódico ..... 50 mg  
Sulfametacina sódica ..... 50 mg  
Vehículo c.b.p. .... 1 g

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado en el agua de bebida.

## PRESENTACIÓN

25 g

## INDICACIONES

Antibiótico y antiprotozoario bacteriostático recomendado en porcinos para el tratamiento de colibacilosis porcina, estreptococosis, salmonelosis, pododermatitis y problemas respiratorios (*Pasteurella multocida* y *Bordetella bronchiseptica*); en aves de engorda y postura, contra coriza infecciosa, coccidiosis, cólera aviar agudo (*Pasteurella multocida*), enfermedad respiratoria crónica complicada y pullorosis o diarrea blanca bacilar.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

### Porcinos y aves de engorda y postura:

25 g de sulfatryl /35 kg (140 mg de sulfonamidas/kg peso corporal), cada 12-24 horas durante 5-7 días.  
A recomendación del Médico Veterinario.

## TIEMPO DE RETIRO:

No administrar 15 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.  
No consumir huevo de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación.

## ADVERTENCIAS:

En aves se recomienda no exceder su uso por más de 7 días, ya que podría haber disminución del crecimiento y alteraciones gastrointestinales. No sobredosificar ya que podría haber reducción en la producción de huevo y deformidades en el cascarón. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.