

Fluviotic



Número de registro: Q-0449-184

USO VETERINARIO

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

Solución Inyectable

Polvo más diluyente (Penicilina + Estreptomicina + Flumetasona)

Combinación antibiótica de amplio espectro con efecto antiinflamatorio

FÓRMULA

Cada frasco con polvo estéril en 20 mL contiene:

Penicilina G procaína..... 4 M.U.I.
Sulfato de estreptomicina..... 5 g

Cada frasco con diluyente estéril contiene:

Flumetasona 1.25 mg
Vehículo c.b.p 20 mL

Una vez reconstituido cada 1 mL contiene:

Penicilina G procaína..... 200,000 U.I.
Sulfato de estreptomicina 250 mg
Flumetasona 0.0625 mg
Vehículo c.b.p 1 mL

PRESENTACIÓN

20 mL (4MUI)

ESPECIES

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos,
porcinos, caninos y felinos.

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones locales o generalizadas, causadas por bacterias sensibles a la acción de la fórmula en bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



DOSIS

**Bovinos productores de carne y leche, equinos,
porcinos, ovinos, caprinos:**

8 mL / 100 kg.

Caninos y felinos:

0.8 mL / 10 kg

Equivalente a 16.000 U.I. de penicilina, 20 mg de estreptomina y 0.005 mg de flumetasona por kg de peso corporal.
Cada 12 horas, durante 4 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

Aranda 
Salud Animal

Fluviotic



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 30 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

No consumir la leche de animales tratados hasta 4 días después de la última aplicación.

No administrar a equinos destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS

Suspender su aplicación en caso de presentarse hipersensibilidades a la fórmula. No se recomienda su aplicación en hembras gestantes.

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor a una temperatura entre 18°C y 30°C. Una vez reconstituido manténgase en refrigeración a 4°C y 8 °C durante máximo 7 días. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivamente veterinario.