



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Sulfaprim

Número de registro: Q-0449-223

USO VETERINARIO



Solución inyectable
Sulfadiazina y trimetoprim
Combinación antimicrobiana de amplio espectro

FÓRMULA

Cada 1 g contiene:

Sulfadiazina sódica	200 mg
Trimetoprim	40 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, intravenosa lenta y subcutánea.

PRESENTACIÓN

20 y 100 mL

INDICACIONES

Combinación antimicrobiana de amplio espectro con poder bactericida para bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caninos y felinos indicada el tratamiento de infecciones digestivas, respiratorias, genitourinarias y septicemias.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 12 y 20 días antes del sacrificio de bovinos y porcinos, respectivamente, destinados al consumo humano. No consumir la leche de animales tratados hasta 2 días después de la última aplicación. No administrar a equinos destinados al consumo humano.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caninos y felinos:

1 mL/8-16 kg (15 a 30 mg/kg de peso corporal), cada 8 a 24 horas.

A recomendación del Médico Veterinario.



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Sulfaprim

Número de registro: Q-0449-223

USO VETERINARIO

TIEMPO DE RETIRO:

No administrar 12 y 20 días antes del sacrificio de bovinos y porcinos, respectivamente, destinados al consumo humano. No consumir la leche de animales tratados hasta 2 días después de la última aplicación. No administrar a equinos destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS:

No administrar por vía SC a equinos. No se recomienda administrar en pacientes con problemas renales y en hembras gestantes. Suspender su aplicación en caso de presentarse hipersensibilidad a la fórmula. Los perros de raza Doberman pinscher son más susceptibles a la fórmula que las demás razas. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor a una temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.