



Estrogenic

Número de registro: Q-0449-224
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica cuantificada



Solución inyectable
Estradiol
Estrógeno natural para terapias reproductivas

FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:

Cipionato de estradiol2 mg
Vehículo c.b.p.....1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

PRESENTACIÓN

10 mL.

INDICACIONES

Formulación específica para bovinos y caninos para la corrección del anestro en ausencia de quistes foliculares, tratamiento de cuerpos lúteos persistentes, coadyuvante en endometritis y piometras. Facilita la expulsión de los exudados, auxiliar en el tratamiento de retención placentaria y fetos momificados. Útil en terapia de reemplazo en perras histerectomizadas con incontinencia urinaria.



Estrogenic

Número de registro: Q-0449-224

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica cuantificada

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Vacas:

Anestro: 1.5 - 2.5 mL/día (3-5 mg/kg de peso corporal).

Metritis/piometra, retención placentaria, feto, momificado
5 mL/día (10mg/kg de peso corporal).

Persistencia de cuerpo lúteo: 2 mL/día (4 mg/kg de peso corporal).

Perras histerectomizadas:

0.05 - 0.25 mL/día (0.1 - 0.5 mg/kg de peso corporal).

El tratamiento puede ser repetido a los 7 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No consumir la carne ni la leche de los animales tratados hasta 30 días después de la última aplicación.

ADVERTENCIAS

No aplicar en animales gestantes. Alteraciones reproductivas y/o productivas son consecuencias probables del empleo de estrógenos, principalmente como resultado de sobredosis, por ejemplo, estros prolongados, desarrollo precoz, irritación genital, quistes foliculares y/o reducción en la producción de leche. En caninos puede presentarse anemia gradual (leucocitosis, leucopenia y trombocitopenia), endometritis y piometras, así como osificación de la epífisis de los huesos largos. Contraindicado en casos de insuficiencia cardíaca, cáncer mamario y uterino. No ingerir. Evitar contacto con los ojos. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivamente veterinario.