



Colmax L.A

Número de registro: Q-0449-226
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica



Solución inyectable
Florfenicol
Antimicrobiano de amplio espectro y larga duración

FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:
Florfenicol 400 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda o subcutánea.

PRESENTACIÓN

20 y 100 mL.

INDICACIONES

Antimicrobiano pde amplio espectro y larga duración indicado en bovinos y porcinos para problemas respiratorios principalmente causados por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la acción del florfenicol, así como micoplasmas.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 14 días (porcinos) y 30 días (bovinos) antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de los animales tratados hasta 8 días después de la última aplicación.



Colmax L.A

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Número de registro: Q-0449-226
USO VETERINARIO

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos productores de carne y leche: 1 mL/20 kg de peso corporal (20 mg/kg) cada 48 horas (intramuscular).
1 mL/10 kg de peso corporal (40 mg/kg). Única aplicación subcutánea.

Porcinos: 1 mL/25-30 kg de peso corporal (13.3-16 mg/kg). Se puede aplicar una segunda dosis a las 48 horas.
A recomendación del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor a una temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.