

# Dexametasona *inyectable*

Número de registro: Q-0449-234  
USO VETERINARIO



Solución inyectable  
Dexametasona  
Antiinflamatorio esteroidal

## FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:

Dexametasona 21 fosfato .....	2.25 mg
Vehículo c.b.p. ....	1.00 mL

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o intravenosa.

## PRESENTACIÓN

20 y 50 mL.

## INDICACIONES

Se indica como antiinflamatorio esteroidal en todas las especies, inductor del parto, así mismo es útil en choque anafiláctico, procesos alérgicos, en protocolos de lactancia inducida y algunas enfermedades metabólicas en rumiantes como cetosis. También útil en edema cerebral, hiperplasia adrenal, insuficiencia suprarrenal, en envenenamientos, intoxicaciones. Coadyuvante en enfermedades reumatológicas, tenosinovitis y bursitis. En enfermedades autoinmunes y colagenosis. Rechazo de órganos trasplantados, anemia hemolítica purpura trombótica trombocitopénica. Shock refractario y enfermedades inflamatorias que no responden a terapia convencional.



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO  
Su venta requiere receta médica

# Dexametasona *inyectable*

Número de registro: Q-0449-234  
USO VETERINARIO

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**Bovinos y equinos:** 8 a 20 mg (3.5 a 8.8 mL).

**Porcinos, ovinos, caprinos:** 4 a 8 mg (1.77 a 3.55 mL).

**Caninos y Felinos:** 0.4 a 2 mg (0.17 a 0.88 mL).

**Inductor de parto en ovinos:** 0.15 mg/PC/día (0.067 mL/PC/día).

**Acetonemia, enfermedades no específicas de la piel, shock y stress:** 15 a 90 mg/kg/PC (0.0067 a 0.04 mL/PC/día).

## ADVERTENCIAS

No utilizar en animales gestantes. Los pacientes bajo tratamiento de dexametasona no deben recibir vacunas con virus atenuados. No utilizar cuando se presente úlcera péptica, diverticulitis, anastomosis intestinal reciente, osteoporosis, miastenia gravis. No utilizar en infecciones virales excepto cuando se utilice en terapia de emergencia. El uso excesivo de dexametasona en animales jóvenes afecta el metabolismo del hueso. Este producto no debe ser manipulado por mujeres embarazadas. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 4 °C y 25 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.

## TIEMPO DE RETIRO

No administrar 8 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación. No administrar a equinos destinados al consumo humano.