


# Boviclox

Número de registro: Q-0449-267

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO  
Su venta requiere receta médica



Suspensión intramamaria

Ampicilina, cloxacilina, dexametasona y sulbactam

Antibiótico de amplio espectro para el control de mastitis en el periodo de producción láctea

## FÓRMULA

Ampicilina sódica .....	25 mg
Cloxacilina sódica .....	25 mg
Dexametasona 21 fosfato .....	0.10 µg
Sulbactam sódico .....	7.5 mg
Vehículo c.b.p. ....	1 mL

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria.

## PRESENTACIÓN

Caja con 12 jeringas, 10 mL cada una.

## INDICACIONES

Tratamiento en casos de mastitis clínica y subclínica de bovinos causadas por bacterias sensibles a la acción de la fórmula, tales como *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Fusobacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinomyces pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* y *Clostridium perfringens*.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**Bovinos:** Antes de insertar la jeringa en el conducto del pezón, ordeñar la glándula mamaria a fondo, desinfectar y secar los pezones. Aplicar el contenido total de 1 jeringa en el cuarto afectado y dar un ligero masaje para facilitar la difusión del producto.

Repetir el tratamiento a las 12 o 24 horas o después de cada ordeña. Se recomienda aplicar mínimo 3 jeringas por cuarto. Si se elige dosificar cada 12 horas, deberá administrar 4 jeringas por cuarto. El intervalo entre dosis y días de tratamiento pueden variar a recomendación del Médico Veterinario.



# Boviclox

Número de registro: Q-0449-267  
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO  
Su venta requiere receta médica

## TIEMPO DE RETIRO

No consumir la leche de animales tratados hasta 72 horas después de la última aplicación. No administrar 7 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

## ADVERTENCIAS:

Agitar antes de usar. No mezclar con otras sustancias o soluciones en la misma jeringa o en el conducto del pezón. No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. Destruir el envase una vez utilizado el producto. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.