




Prolong-Cef

Número de registro: Q-0449-276

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica



Solución inyectable (Polvo más diluyente)

Cefotaxima y sulbactam

Antibiótico de amplio espectro y liberación sostenida más inhibidor de β-lactamasas.

FÓRMULA

Cada frasco con polvo estéril para 1 mL contiene:

Cefotaxima sódica 200 mg

Cada frasco con diluyente estéril para 1 mL contiene:

Sulbactam sódico 40 mg

Vehículo c.b.p. 0.84 mL

Una vez reconstituido cada 1 mL contiene:

Cefotaxima sódica 200 mg

Sulbactam sódico 40 mg

Vehículo c.b.p. 1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

PRESENTACIÓN

Caja: 5, 10, 20, 50 y 100 g de polvo estéril y diluyente c.b.p.
25, 50, 100, 250 y 500 mL.

Frasco: 5, 10, 20, 50 y 100 g de polvo estéril.

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de las infecciones de los bovinos destinados a la producción de leche, caninos y felinos domésticos, ocasionadas por microorganismos anaerobios, gram positivos y gram negativos, así como en infecciones por microorganismos aerobios.



Prolong-Cef

Número de registro: Q-0449-276

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos de leche: 1 mL/20 kg (equivalente a 10 mg/kg de cefotaxima y 2 mg/kg de sulbactam), cada 24 horas durante 3-4 días.

Caninos y felinos: 1.5 mL/10 kg (equivalente a 30 mg/kg de cefotaxima y 6 mg/kg de sulbactam), cada 24 horas durante 3-5 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No consumir la leche de animales tratados hasta 8 ordeñas o 96 horas después de la última aplicación.

ADVERTENCIAS

En caso de presentar hipersensibilidad a algún componente de la fórmula, suspender el tratamiento de inmediato. Agitar antes de usar. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 4 °C y 25 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Una vez reconstituido mantener en refrigeración entre 4 °C y 7 °C por no más de 20 días. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.