

Fluviotic®

Número de registro: Q-0449-298
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Suspensión inyectable (Polvo más diluyente)
Penicilina, estreptomicina y flumetasona
Combinación antibiótica de amplio espectro con efecto
antiinflamatorio

FÓRMULA

Cada frasco con polvo estéril para 1 mL contiene:

Penicilina G procaína	200,000 U.I.
Sulfato de estreptomicina	250 mg

Cada frasco con diluyente estéril para 1 mL contiene:

Flumetasona	0.0625 mg
Vehículo c.b.p.	0.75 mL

Una vez reconstituido cada 1 mL contiene:

Penicilina G procaína	200,000 U.I.
Sulfato de estreptomicina	250 mg
Flumetasona	0.0625 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

PRESENTACIÓN

10 mL (2 MUI), 20 mL (4 MUI), 30 mL (6 MUI) y 50 mL (10 MUI)



Fluviotic®

Número de registro: Q-0449-298

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

INDICACIONES

Combinación antibiótica de amplio espectro con efecto antiinflamatorio para el tratamiento de infecciones locales o generalizadas, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 1. Espectro de acción de <i>Fluviotic</i> ® por especie					
Agente etiológico	Bovinos carne y leche	Equinos	Porcinos	Ovinos y caprinos	Caninos y felinos
<i>Clostridium spp.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Corynebacterium spp.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Listeria monocytogenes</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Streptococcus, spp.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Nocardia spp.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Leptospira spp.</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Pasteurella multocida</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Fusiformis nodosus</i>	✓			✓	
<i>Actinobacillus lignieresii</i>	✓			✓	
<i>Moraxella bovis</i>	✓				
<i>Bacillus anthracis</i>	✓				
<i>Erysipelothrix insidiosa</i>			✓		

ADVERTENCIAS

Suspender su aplicación en caso de presentarse hipersensibilidad a la fórmula. No se recomienda su aplicación en hembras gestantes. Agitar antes de usar. Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 25 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Una vez reconstituido, mantener en refrigeración entre 4 °C y 8 °C por no más de 7 días. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos y caprinos: 8 mL/100 kg. Caninos y felinos: 0.8 mL/10 kg. Equivalente a 16,000 U.I. de penicilina, 20 mg de estreptomycin y 0.005 mg de flumetasona por kg de peso corporal. Cada 12 horas, durante 4 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 30 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de animales tratados hasta 4 días después de la última aplicación. No administrar a equinos destinados al consumo humano.