



Fluviotic®

Número de registro: Q-0449-184

USO VETERINARIO

Suspensión inyectable (Polvo más diluyente)
Penicilina, estreptomina y flumetasona
Combinación antibiótica de amplio espectro con efecto antiinflamatorio

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO**
Su venta requiere receta médica



FÓRMULA

Una vez reconstituido cada 1 mL contiene:
Penicilina G procaína 200,000 U.I.
Sulfato de estreptomina 250 mg
Flumetasona 0.0625 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos: 8 mL/100 kg.

Caninos y felinos: 0.8 mL/10 kg.

Equivalente a 16,000 U.I. de penicilina, 20 mg de estreptomina y 0.005 mg de flumetasona por kg de peso corporal.

Cada 12 horas, durante 4 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

Intramuscular.

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones locales o generalizadas, causadas por bacterias sensibles a la acción de la fórmula en bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

ADVERTENCIAS

Suspender su aplicación en caso de presentarse hipersensibilidad a la fórmula. No se recomienda su aplicación en hembras gestantes. Agitar antes de usar. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 18°C y 30°C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Una vez reconstituido, mantener en refrigeración entre 4°C y 8°C por no más de 7 días. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 30 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

No consumir la leche de animales tratados hasta 4 días después de la última aplicación.

No administrar a equinos destinados al consumo humano.

PRESENTACIÓN

Caja: 9 g de polvo estéril + diluyente c.b.p. 20 mL.