

Oxi-T

Número de registro: Q-0449-116

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica



FÓRMULA

Cada 1 g contiene:

Oxitetraciclina 55 mg
Excipiente c.b.p. 1 g

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Porcinos y aves (engorda y postura):

2 sobres/35 kg en 25 L de agua de bebida (70 mg/kg de peso corporal) durante 5 a 7 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

Oral, mezclado con el agua de bebida o en tomas individuales.

INDICACIONES

Indicado en porcinos y aves para el tratamiento de infecciones bacterianas causantes de enfermedades respiratorias y gastroenteríticas. En porcinos para el tratamiento de erisipela y leptospirosis, así como coadyuvante en casos de neumonía enzoótica y micoplasmosis. En aves para el tratamiento de cólera aviar, micoplasmosis y coriza infecciosa.

ADVERTENCIAS

El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. **Producto de uso exclusivamente veterinario.**

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 30 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

No consumir huevo de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación.

PRESENTACIÓN

Sobres de 25 g